PRESTAVERT©

NECTARINIER

Prunus persica

Les pêchers ont la peau duveteuse et leur chair n'adhère pas au noyau, contrairement aux brugnons, qui ont une peau lisse et dont la chair adhère au noyau.
La **nectarine** a une peau **lisse** et son noyau **n'adhère pas**, dans chacun de ces groupes, il existe des fruits à chair blanche ou à chair jaune.
La familles des pêchers sont sensibles à la **cloque,** des traitements automnaux et hivernaux à la bouillie bordelaise avant l'ouverture des bourgeons sont très conseillés.

*La **cloque** est une maladie du pêcher due au champignon 'Taphrina déformans'. Elle s'attaque aux feuilles, aux jeunes pousses et parfois aux fruits qu'elle altère en surface. Les feuilles atteintes changent de couleur et deviennent généralement rouges ou vert pâle. Surtout, elles prennent un aspect tordu et enroulé puis s'épaississent et se boursouflent lorsque l'infection progresse. De plus les rameaux terminaux dépérissent, ce qui rend problématique le développement des fruits, l'année de l'infection, et le réduit l'année suivante. L'arbre devient plus fragile, et cette perte répétée des feuilles au printemps peut conduire à la mort de l'arbre après quelques années. Les spores du champignon 'Taphrina deformans', produites sur les feuilles infectées, sont capables de subsister toute une saison sous les écailles des bourgeons, et de s'y infiltrer au printemps suivant lors de leur ouverture. La première infection se produit donc lorsque les bourgeons foliaires, sortant de leur dormance, commencent à gonfler puis à s'ouvrir (moment idéal de traitement).*

CARDINAL: *Chair blanche*, mature en **début aout.**
Peau jaune à rouge-violet côté soleil, bonne à croquer, chair juteuse, sucrée, fondante et charnue. Autofertile

INDEPENDANCE : *Chair jaune*, mature en **début aout**.
Beau fruit rouge brillant, sa chair est ferme, juteuse, sucrée et parfumée. Autofertile.